

TOPINAMBUR

Helianthus tuberosus – Asteraceae

Allgemeines:

Nord- und Mittelamerika; als stärkereiche Süßkartoffel essbar, als Gartenpflanze eingeführt und angebaut.

Beschreibung:

Mehrjährige, gelb blühende, bis 3 m hohe Pflanze (Spätblüher). Bildet Massenbestände.

Standort:

Feuchte, uferbegleitende Hochstaudenfluren, lichte Auwälder, selten auf Ruderalflächen.


Probleme:

- **Für den Wasserbau:** Erosionsgefahr an ungeschützten Gerinneböschungen durch abgestorbene Pflanzen im Herbst.
- **Für den Naturschutz:** Verdrängung der standorttypischen Ufervegetation. Nagetiere und Wildtiere wühlen den Boden bei der Nahrungssuche auf, dadurch erhöhte Erosionsgefahr.
- **Für den Menschen:** keine.

Bekämpfung:

Mechanisch:

- Ausreißen,
- Ausgraben der Wurzelknollen,
- Mähen (2 x/Jahr),
- Mulchen (2 x/Jahr),
- Mulchen und anschließendes Fräsen (kurz vor oder während der Blüte),
- laufende Kontrollen.





Blüten



Triebe mit Blütenknospen



Einzelblüte



Blüten und Triebe



Typische Wuchsform